► **M** Rédaction d'une démonstration par récurrence

Pour tout entier naturel n on considère la **proposition** P_n : « ... ».

• initialisation

On vérifie que P_0 : « ... » est vraie

• hérédité

Soit k un entier naturel tel que : P_k : « ... » est vraie (H.R.)

Démontrons que P_{k+1} : « ... » est vraie... (calculs) ... P_{k+1} est vraie.

Conclusion

Il résulte des deux points précédents et du principe de récurrence que : pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie.

□ **A01** $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

Démontrer par récurrence que pour tout n entier naturel : $u_n = 2^n + 1$.

□ **A02** $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 2u_n - n + 1$.

Démontrer par récurrence que pour entier naturel n , on a : $u_n \geq n$.

□ **A03** $v_1 = -1$ et pour tout n entier naturel non nul : $v_{n+1} = -3v_n + 8$.

Démontrer que pour tout n entier naturel non nul : $v_n = (-3)^n + 2$.

□ **A04** Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on considère P_n : « $6^n + 1$ est un multiple de 5 »

Montrer que P_n est héréditaire, est-elle vraie pour tout entier naturel n ?

D Sens de variation d'une suite

La suite (u_n) est :

- **croissante** lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n \leq u_{n+1}$
- **croissante à partir du rang n_0** lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0$ on a : $u_n \leq u_{n+1}$
- **décroissante** lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n \geq u_{n+1}$
- **décroissante à partir du rang n_0** lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0$ on a : $u_n \geq u_{n+1}$

P Le **signe de $u_{n+1} - u_n$** permet d'obtenir le sens de variation de (u_n) :

- si pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors (u_n) est **croissante**,
- si pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est **décroissante**.

□ **A05** $u_0 = 8$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 0,25u_n + 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 , conjecturer le sens de variation de (u_n) .
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} \leq u_n$.
3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

► **P** inégalités et opérations élémentaires

- si on ajoute/retranche un même nombre à chaque membre d'une inégalité alors on conserve le sens de la relation d'ordre
- si on multiplie/divise par un nombre non nul chaque membre d'une inégalité alors :
  - on conserve le sens de la relation d'ordre lorsque ce nombre est positif
  - on inverse le sens de la relation d'ordre lorsque ce nombre est négatif

□ **A06** $v_0 = 3$ et pour tout n entier naturel :

$$v_{n+1} = \frac{v_n + 12}{3}$$

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $v_n \leq v_{n+1}$.
2. En déduire le sens de variation de la suite (v_n) .

□ **A07** Soit f une fonction croissante sur $\mathbb{R}$ et (u_n) la suite de premier terme u_0 telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On suppose que $u_1 \geq u_0$: étudier le sens de variation de (u_n) .
2. On suppose que $u_1 \leq u_0$: étudier le sens de variation de (u_n) .

F À connaître :

$$1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

D $\forall x \in \mathbb{R}$ la **valeur absolue** de x est le réel $|x|$ vérifiant : $|x| = \sqrt{x^2}$.

P Soit x un réel et ε un réel strictement positif.

- pour tout réel x on a : $|x| \geq 0$
- si $x \geq 0$ alors $|x| = x$ et si $x < 0$ alors $|x| = -x$
- A et B sont deux points d'un axe $(O; \vec{i})$ normé c'est-à-dire tel que $\|\vec{i}\| = 1$, on note a l'affixe de A et b celle de B , alors : $AB = |a - b|$, ou encore : $AB = |b - a|$ et on écrit parfois : $d(a; b) = |a - b|$.
- pour tout $\varepsilon > 0$, on a l'équivalence : $-\varepsilon < x < \varepsilon \Leftrightarrow |x| < \varepsilon$

D Notion de limite d'une suite

- (u_n) **converge vers** $\ell \in \mathbb{R}$ ^{déf} $\Leftrightarrow$ tout intervalle ouvert centré en ℓ contient toutes les nombres u_n à partir d'un certain rang, on dit alors que la limite de la suite (u_n) est le réel ℓ et on écrit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou « $u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ »
- (u_n) est **convergente** ^{déf} $\Leftrightarrow$ il existe un réel ℓ vers lequel elle converge (on admet l'unicité d'un tel réel ℓ)

- (u_n) **converge vers** $\ell \in \mathbb{R}$ si et seulement si :
 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}$, si $n \geq n_0$ alors $|u_n - \ell| < \varepsilon$
 (on peut aussi s'écrire $u_n \in]\ell - \varepsilon ; \ell + \varepsilon[$ ou $\ell - \varepsilon < u_n < \ell + \varepsilon$)
- (u_n) **diverge vers** $+\infty$ ^{déf} $\Leftrightarrow$ tout intervalle de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les nombres u_n à partir d'un certain rang
 On dit alors que (u_n) **admet pour limite** $+\infty$, on écrit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
 ou $u_n \rightarrow +\infty$
- (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si et seulement si :
 $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$, si $n \geq n_0$ alors $u_n > A$
 (l'inégalité $u_n > A$ s'écrit aussi $u_n \in]A ; +\infty[$)
- (u_n) **diverge vers** $-\infty$ lorsque la suite $(-u_n)$ diverge vers $+\infty$:
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = +\infty$
- une suite est **divergente** lorsque qu'elle n'est pas convergente
 (une suite peut être divergente de différentes manières : elle admet une limite mais c'est $+\infty$ ou $-\infty$, ou bien elle n'a pas de limite du tout)

□ **A08** En revenant à la définition démontrer que la suite (u_n) converge vers $7 : \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 7 + \frac{1}{n}$.

► **Règle : limite d'une somme** ℓ et ℓ' sont des réels

si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F. I.

Remarque : la différence $A - B$ peut s'écrire comme somme : $A + (-B)$.

- **A09** Lorsque cela est possible, donner un sens à :
- « $5 + (+\infty)$ »
  - « $4 - (+\infty)$ »
  - « $(+\infty) + 9$ »
  - « $(+\infty) - 129$ »
  - « $(+\infty) - (-\infty)$ »
  - « $(+\infty) - (+\infty)$ »
  - « $(+\infty) + (+\infty)$ »
  - « $(-\infty) + (-\infty)$ »
  - « $0 - (-\infty)$ »

► **Règle : limite d'un produit** ℓ et ℓ' sont des réels

si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) =$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F. I.

- **A10** Lorsque cela est possible, donner un sens à :
- « $(-2) \times (+\infty)$ »
  - « $(-\infty) \times (-3)$ »
  - « $(+\infty) \times 0$ »
  - « $(-\infty) \times (-\infty)$ »
  - « $(+\infty) \times (-\infty)$ »

F **Limites de référence**
 Soit k une constante réelle.

- si $k > 0$ alors : $kn, kn^2, kn^3, k\sqrt{n}, ke^n$ **divergent vers** $+\infty$
- si $k < 0$ alors : $kn, kn^2, kn^3, k\sqrt{n}, ke^n$ **divergent vers** $-\infty$
- quel que soit k :
 $\frac{k}{n}, \frac{k}{n^2}, \frac{k}{n^3}, \frac{k}{\sqrt{n}}, \frac{k}{e^n}$ **convergent vers 0**

A11 Déterminer la limite de (u_n) :

1. $u_n = -n + 80$ 2. $u_n = \sqrt{n} + \frac{5}{n^2}$ 3. $u_n = n^2 + n^3$

M Pour lever une indétermination dans un polynôme en n on peut « mettre de force » en facteur la plus grande puissance de n .

A12 Pour tout $n \in \mathbb{N} : u_n = 5n^2 - 3n + 2, v_n = -3n^2 + 8n + 1$. Déterminer les limites de : (u_n) et (v_n) .

► Règle : limite d'un quotient ℓ et ℓ' sont des réels

si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	$0^+ \text{ ou } 0^-$	0	$0^+ \text{ ou } 0^-$	$\pm\infty$
alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	<i>F.I.</i>	$\pm\infty$	<i>F.I.</i>

A13 Si possible, donner un sens à :

• « $\frac{5}{+\infty}$ »   • « $\frac{-7}{-\infty}$ »   • « $\frac{-3}{0^+}$ »   • « $\frac{7}{0^-}$ »   • « $\frac{-2}{0^-}$ »
 • « $\frac{+\infty}{-\infty}$ »   • « $\frac{+\infty}{+\infty}$ »   • « $\frac{0^+}{0^-}$ »   • « $\frac{+\infty}{0^-}$ »   • « $\frac{+\infty}{0^+}$ »

A14 Déterminer la limite de (u_n) avec :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{5n - 1}{3n + 1}$$

Retenons qu'il y a **quatre** type de **formes indéterminées** :

• « $\infty - \infty$ »   • « $0 \times \infty$ »   • « $\frac{0}{0}$ »   • « $\frac{\infty}{\infty}$ »

Attention, une inégalité stricte entre u_n et v_n donnera une inégalité **large** sur les limites de u_n et v_n .

► Théorème de comparaison

- si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$
- si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

exemple de rédaction

On a : $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \end{cases}$ donc d'après le théorème de comparaison on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

A15 Démontrer le premier point du théorème de comparaison.

A16 Pour tout n entier naturel, on pose : $u_n = 3n^2 + (-1)^n$. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

A17 Pour tout n entier naturel, on pose : $w_n = -n^2 + 5 \cos(2n - 1)$. Déterminer la limite de la suite (w_n) .

► Théorème des gendarmes

Si $(u_n), (v_n)$ et (w_n) sont des suites telles que :

- à partir d'un certain rang : $u_n \leq v_n \leq w_n$
  - les suites (u_n) et (w_n) sont convergentes et ont **même limite** ℓ
- alors la suite (v_n) est convergente et sa limite est ℓ .

exemple de rédaction

On a : $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \end{cases}$
 donc d'après le théorème des gendarmes on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

A18 Déterminer la limite éventuelle de la suite (u_n) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\sin(n) + 2}{n}$$

A19 Déterminer la limite éventuelle de la suite (u_n) de terme général :

1. $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n + 2}$ 2. $u_n = n^2 + (-1)^n$

D suite majorée, minorée, bornée

- (u_n) est **majorée** par la constante $M \stackrel{\text{déf}}{\iff}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n \leq M$
on dit alors que le nombre M est un **majorant** de la suite (u_n)
- (u_n) est **minorée** par la constante $m \stackrel{\text{déf}}{\iff}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $m \leq u_n$,
on dit alors que le nombre m est un **minorant** de la suite (u_n)
- la suite (u_n) est **bornée** $\stackrel{\text{déf}}{\iff}$ elle est à la fois majorée et minorée.

A20 Oral Démontrer qu'une suite croissante est minorée.

A21 Démontrer que la suite (u_n) est bornée : $u_n = 3 + \sin(n)$.

► Théorème de convergence monotone

- si une suite est **croissante** et **majorée**, alors elle est **convergente**
- si une suite est **décroissante** et **minorée**, alors elle est **convergente**

A22 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 3$$

1. Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 9$.
2. En déduire que (u_n) est convergente.
3. On note ℓ la limite de (u_n) , justifier que $\ell = \frac{2}{3}\ell + 3$, en déduire ℓ .

Théorème

- si une suite est **croissante** et **non majorée**, alors elle **diverge** vers $+\infty$
- si une suite est **décroissante** et **non minorée**, alors elle **diverge** vers $-\infty$

A23 Oral Justifier à l'oral le premier point du théorème précédent.

Inégalité de Bernoulli

Soit a un réel tel que $a > -1$, alors : $\forall n \in \mathbb{N}, (1+a)^n \geq 1+na$.

A24 Démontrer par récurrence sur n l'inégalité de Bernoulli.

► Règle : limite de q^n

Soit $q \in \mathbb{R}$ une constante, on s'intéresse à la limite éventuelle de q^n :

	$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$	pas de limite	0	1	$+\infty$

exemple de rédaction

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,8)^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$.

- on a : $-1 < -0,8 < 1$, or si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ (cours),
donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,8)^n = 0$
- on a : $2 > 1$, or si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ (cours),
donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$

A25 Démontrer la règle de la limite de q^n en étudiant successivement les cas suivants : $q = 1, q > 1, 0 < q < 1, q = 0, -1 < q < 0$ et $q \leq -1$.

A26 Étudier l'existence d'une limite, la déterminer lorsqu'elle existe :

1. $u_n = \left(\frac{7}{6}\right)^n$
2. $u_n = (-1)^n$
3. $u_n = (1 - \sqrt{2})^n$

A27 Pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = 12^n - 7^n$.

Déterminer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

A28 Étudier l'existence d'une limite, la déterminer lorsqu'elle existe :

1. $u_n = \frac{2^n - 5^n}{3^n + 4^n}$
2. $u_n = \frac{5^n + (-3)^n}{2^n + 1}$

A29 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0,5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3u_n}{1 + 2u_n}$$

1. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$$

2. En déduire la limite de la suite (u_n) .