Préparation bac : calcul d'une intégrale

Ex 01*

On cherche à calculer :

$$I = \int_0^{\ln 5} \frac{1}{e^x + 1} dx$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$$

1. Déterminer des constantes réelles a et b telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a + b \times \frac{e^x}{1 + e^x}$$

2. En déduire une primitive, au choix, de f sur $\mathbb{R}$.

3. Déterminer la valeur exacte de I .

Corrigé

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$a + b \times \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{a(1 + e^x)}{1 + e^x} + \frac{be^x}{1 + e^x} = \frac{a + ae^x + be^x}{1 + e^x} = \frac{(a + b)e^x + a}{1 + e^x}$$

On doit donc avoir pour tout réel x :

$$\frac{1}{1 + e^x} = \frac{(a + b)e^x + a}{1 + e^x}$$

autrement dit :

$$\frac{0e^x + 1}{1 + e^x} = \frac{(a + b)e^x + a}{1 + e^x}$$

Par identification on obtient :

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ 1 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

On a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, posons : $u(x) = e^x + 1$, d'où : $u'(x) = e^x$.

On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} = 1 - \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Or,

l'une des primitives de $x \mapsto 1$ est $x \mapsto x$ et l'une des primitive de $\frac{u'}{u}$ ($u > 0$)

est $\ln u$, donc en notant F l'une des primitives de $x \mapsto 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$ on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = x - \ln(u(x))$$

soit finalement :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = x - \ln(e^x + 1)$$

3. On a :

$$I = \int_0^{\ln 5} f(x) dx$$

avec f continue sur $[0; \ln 5]$ et F est l'une des primitives de f sur cet intervalle donc :

$$\int_0^{\ln 5} f(x) dx = [F(x)]_0^{\ln 5}$$

Or

$$\begin{aligned} [F(x)]_0^{\ln 5} &= [x - \ln(e^x + 1)]_0^{\ln 5} \\ &= \ln 5 - \ln(e^{\ln 5} + 1) - (0 - \ln(e^0 + 1)) \\ &= \ln 5 - \ln(5 + 1) - 0 + \ln(1 + 1) \\ &= \ln 5 - \ln 6 + \ln 2 \\ &= \ln 5 - \ln(2 \times 3) + \ln(2) \\ &= \ln 5 - (\ln 2 + \ln 3) + \ln 2 \\ &= \ln 5 - \ln 2 - \ln 3 + \ln 2 \\ &= \ln 5 - \ln 3 \end{aligned}$$

Finalement : $I = \ln 5 - \ln 3$.

Ex 02*

On pose :

$$A = \int_0^1 \frac{1}{e^x + 2} dx \text{ et } B = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx$$

1. Calculer $2A + B$.
2. Calculer B .
3. Déterminer la valeur de A .

Corrigé

1. On a :

$$\begin{aligned}
2A + B &= 2 \int_0^1 \frac{1}{e^x + 2} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx \\
&= \int_0^1 2 \times \frac{1}{e^x + 2} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx \\
&= \int_0^1 \frac{2}{e^x + 2} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{2}{e^x + 2} + \frac{e^x}{e^x + 2} \right) dx \\
&= \int_0^1 \frac{e^x + 2}{e^x + 2} dx \\
&= \int_0^1 1 dx \\
&= [x]_0^1 \\
&= 1 - 0 \\
&= 1
\end{aligned}$$

Conclusion : $2A + B = 1$.

2. Calculons B .

$$B = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx$$

En posant $u(x) = e^x + 2$, on a $u'(x) = e^x$ donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{e^x}{e^x + 2} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Or, l'une des primitives de $\frac{u'}{u}$ ($u > 0$) est $\ln u$ donc l'une des primitives de

$x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 2}$ est $x \mapsto \ln(u(x))$, c'est-à-dire : $x \mapsto \ln(e^x + 2)$.

Comme de plus $x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 2}$ est continue sur $[0; 1]$, on en déduit :

$$\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} = [\ln(e^x + 2)]_0^1$$

Or,

$$\begin{aligned}
&[\ln(e^x + 2)]_0^1 \\
&= \ln(e^1 + 2) - \ln(e^0 + 2) \\
&= \ln(e + 2) - \ln(1 + 2) = \ln(e + 2) - \ln(3)
\end{aligned}$$

Donc : $B = \ln(e + 2) - \ln(3)$.

3. Calculons A .

On a montré que $2A + B = 1$, or $B = \ln(e + 2) - \ln(3)$ donc :

$$\begin{aligned}
2A + \ln(e + 2) - \ln(3) &= 1 \Leftrightarrow 2A = 1 - \ln(e + 2) + \ln(3) \\
\Leftrightarrow 2A &= 1 + \ln\left(\frac{3}{e + 2}\right) \Leftrightarrow A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{e + 2}\right)
\end{aligned}$$

Conclusion :

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{e + 2}\right)$$

Autrement dit :

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 2} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{e + 2}\right)$$

The screenshot shows a TI-84 Plus calculator screen with the following text: "NORMAL FLOTT AUTO RÉEL RAD MP" at the top. Below that, the integral expression is displayed: $\int_0^1 \left(\frac{1}{e^x + 2} \right) dX = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{e + 2} \right)$. The result of the calculation is shown as "1." at the bottom right of the screen.

Ex 03* [d'après bac]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$

1. Calculer :

$$u_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} + u_n = \frac{1}{n+1}$$

3. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.

4. Démontrer que la suite (u_n) est minorée par 0.

5. Dédurre des questions précédentes que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Corrigé

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

1. Calcul de $u_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$

L'une des primitives de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est $x \mapsto \ln(x+1)$ et $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0; 1]$ donc :

$$u_0 = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln(1+1) - \ln(0+1) = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

Finalement : $u_0 = \ln 2$.

2. Démontrons que pour tout $n \in \mathbb{N} : u_{n+1} + u_n = \frac{1}{n+1}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} + u_n &= \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx + \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{1+x} + \frac{x^n}{1+x} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n+1} + x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x+1)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n \times \frac{x+1}{x+1} dx \\ &= \int_0^1 x^n \times 1 dx = \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1^{n+1}}{n+1} - \frac{0^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} - 0 \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

On a donc bien : $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} + u_n = \frac{1}{n+1}$.

3. Démontrons que (u_n) est décroissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx - \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{1+x} - \frac{x^n}{1+x} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx \end{aligned}$$

Or, pour $0 \leq x \leq 1$ on a $x^n \geq 0$, $x-1 \leq 0$ et $1+x > 0$ donc $\frac{x^n(x-1)}{1+x} \leq 0$ puis en intégrant dans l'ordre croissant des bornes :

$$\int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx \leq 0$$

autrement dit : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$ donc (u_n) est décroissante.

4. Démontrer que la suite (u_n) est minorée par 0.

Pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $x \geq 0$ donc $x^n \geq 0$.

On a : $x \geq 0$ donc $x+1 \geq 1 > 0$ donc $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$.

Puis en intégrant dans l'ordre croissant des bornes :

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \geq \int_0^1 0 dx$$

autrement dit : $u_n \geq 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ et 0 est une constante donc la suite (u_n) est minorée par 0.

5. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc (u_n) est convergente.

Notons ℓ sa limite. On a vu que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} + u_n = \frac{1}{n+1}$ donc les deux membres de cette égalité ont même limite.

Or $u_{n+1} \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell$ donc $u_{n+1} + u_n \rightarrow 2\ell$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ donc $2\ell = 0$ d'où $\ell = 0$.

Conclusion :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Ex 04* [suite et intégrale, d'après bac]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n = \int_0^n e^{-x^2} dx$$

On ne cherchera ni à déterminer une primitive de $x \mapsto e^{-x^2}$ sur $[0; +\infty[$ ni à déterminer la formule explicite de u_n .

1. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .
2. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $-x^2 \leq -2x + 1$, en déduire que la suite (u_n) est majorée par $\frac{e}{2}$.
3. La suite (u_n) est-elle convergente ?

Corrigé

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \int_0^n e^{-x^2} dx$$

1. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Remarquons que : $u_0 = \int_0^0 e^{-x^2} dx = 0$ puis en utilisant la calculatrice:

On peut donc conjecturer que « (u_n) est croissante ».

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \int_0^{n+1} e^{-x^2} dx - \int_0^n e^{-x^2} dx \\ &= \int_0^{n+1} e^{-x^2} dx + \int_n^0 e^{-x^2} dx \\ &= \int_n^0 e^{-x^2} dx + \int_0^{n+1} e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

$$= \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx \quad (\text{Chasles})$$

Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x^2} > 0$, puis en intégrant dans l'ordre croissant des bornes on obtient :

$$\int_n^{n+1} e^{-x^2} dx \geq 0$$

autrement dit : $u_n \geq 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$ donc (u_n) est croissante.

2. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $-x^2 \leq -2x + 1$, en déduire que la suite (u_n) est majorée par $\frac{e}{2}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$x^2 - 2x + 1 = (x)^2 - 2(x)(1) + (1)^2 = (x - 1)^2$$

Or le carré d'un réel est toujours positif ou nul donc : $x^2 - 2x + 1 \geq 0$

autrement dit : $-2x + 1 \geq -x^2$; on a bien : $\forall x \in \mathbb{R}$, $-x^2 \leq -2x + 1$ (*).

La fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$ donc on déduit de (*)

que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^{-x^2} \leq e^{-2x+1}$, puis en intégrant dans l'ordre croissant des bornes on obtient :

$$\int_0^n e^{-x^2} dx \leq \int_0^n e^{-2x+1} dx$$

autrement dit :

$$u_n \leq \int_0^n e^{-2x+1} dx$$

$x \mapsto e^{-2x+1}$ est de la forme $x \mapsto e^{ax+b}$ avec $a \neq 0$, dont l'une des primitives

est $x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b}$, donc l'une des primitives de $x \mapsto e^{-2x+1}$ est $-\frac{1}{2} e^{-2x+1}$

et comme de plus cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $[0; n]$ on en déduit :

$$\int_0^n e^{-2x+1} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x+1} \right]_0^n$$

Or,

$$\begin{aligned} \left[-\frac{1}{2} e^{-2x+1} \right]_0^n &= -\frac{1}{2} e^{-2n+1} - \left(-\frac{1}{2} e^{-2(0)+1} \right) \\ &= -\frac{1}{2} e^{-2n+1} + \frac{1}{2} e = \frac{e}{2} - \frac{1}{2} e^{-2n+1} < \frac{e}{2} \end{aligned}$$

On a donc :

$$u_n = \int_0^n e^{-2x+1} dx < \frac{e}{2}$$

donc : $u_n < \frac{e}{2}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < \frac{e}{2}$ et $\frac{e}{2}$ est une constante donc (u_n) est majorée par $\frac{e}{2}$.

3. La suite (u_n) est-elle convergente ?

La suite (u_n) est croissante et majorée donc d'après le théorème de convergence monotone elle est convergente.

Complément On pourra démontrer dans quelques années que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Ex 05* [intégration par partie, d'après bac]

À l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx$$

Corrigé

On a :

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx = \int_0^\pi u(x) v'(x) dx$$

On pose : $u(x) = x$ $v'(x) = \sin(x)$
 $u'(x) = 1$ $v(x) = -\cos(x)$ (convient)

Les fonctions u' et v' sont continues sur $[0 ; \pi]$ donc on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^\pi u(x)v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_0^\pi - \int_0^\pi u'(x)v(x) dx$$

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx = [-x \cos(x)]_0^\pi - \int_0^\pi 1(-\cos(x)) dx$$

$$= [-x \cos(x)]_0^\pi + \int_0^\pi \cos(x) dx = [-x \cos(x)]_0^\pi + [\sin(x)]_0^\pi$$

$$= [-x \cos(x) + \sin(x)]_0^\pi = (-\pi \cos(\pi) + \sin(\pi)) - (-0 \cos(0) + \sin(0))$$

$$= -\pi \times (-1) + 0 - 0 = \pi$$

Finalement : $\int_0^\pi x \sin(x) dx = \pi$

Ex 06* [intégration par parties, d'après bac]

À l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$I = \int_0^1 2x^3 e^{x^2-1} dx$$

Indication : $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^3 e^{x^2-1} = x^2 \times 2x e^{x^2-1}$.

Corrigé

On a :

$$\int_0^1 x^2 \times 2x e^{x^2-1} dx = \int_0^1 u(x) v'(x) dx$$

On pose : $u(x) = x^2$ $v'(x) = 2x e^{x^2-1}$
 $u'(x) = 2x$ $v(x) = e^{x^2-1}$ (convient)

Les fonctions u' et v' sont continues sur $[0 ; 1]$ donc on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^1 u(x)v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x) dx$$

$$\int_0^1 x^2 \times 2x e^{x^2-1} dx = [x^2 e^{x^2-1}]_0^1 - \int_0^1 2x e^{x^2-1} dx$$

$$= [x^2 e^{x^2-1}]_0^1 - [e^{x^2-1}]_0^1 = [x^2 e^{x^2-1} - e^{x^2-1}]_0^1$$

$$= 1^2 e^{1^2-1} - e^{1^2-1} - (0^2 e^{0^2-1} - e^{0^2-1})$$

$$= 1e^0 - e^0 - (0 - e^{-1}) = 1 \times 1 - 1 + e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Finalement :

$$I = \int_0^1 2x^3 e^{x^2-1} dx = \frac{1}{e}$$

Ex 07 [double intégration par partie, d'après bac]**

À l'aide de deux intégrations par parties, calculer :

$$I = \int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx$$

Corrigé

On a :

$$\int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx = \int_0^{2\pi} u(x) v'(x) dx$$

On pose : $u(x) = e^x$ $v'(x) = \cos(x)$
 $u'(x) = e^x$ $v(x) = \sin(x)$ (convient)

Les fonctions u' et v' sont continues sur $[0 ; 2\pi]$ donc on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^{2\pi} u(x)v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} u'(x)v(x) dx$$

$$\int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx = [e^x \sin(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$$

$$I = e^{2\pi} \sin(2\pi) - e^0 \sin(0) - \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$$

$$I = 0 - 0 - K$$

$$I = -K$$

en posant : $K = \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$.

Calculons $K = \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$ à l'aide d'une intégration par parties :

On pose : $u(x) = e^x$ $v'(x) = \sin(x)$
 $u'(x) = e^x$ $v(x) = -\cos(x)$ (convient)

Les fonctions u' et v' sont continues sur $[0 ; 2\pi]$ donc on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^{2\pi} u(x)v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} u'(x)v(x) dx$$

$$K = [e^x \times (-\cos(x))]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x (-\cos(x)) dx$$

$$K = [-e^x \cos(x)]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx$$

$$K = -e^{2\pi} \cos(2\pi) + e^0 \cos(0) + I$$

$$K = -e^{2\pi} \times 1 + 1 + I$$

$$K = -e^{2\pi} + 1 + I$$

Or $I = -K$ autrement dit $K = -I$, donc :

$$-I = -e^{2\pi} + 1 + I$$

$$2I = e^{2\pi} - 1$$

$$I = \frac{e^{2\pi} - 1}{2}$$

Finalement :

$$I = \int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx = \frac{e^{2\pi} - 1}{2}$$

Remarque

On pourrait aussi effectuer une double intégration par parties en posant à chaque fois $v'(x) = e^x$.

Ex 08* [suite et intégrale, exercice 2 « sujet 0 janvier 2024 »]

L'exercice est constitué de deux parties indépendantes.

Partie I

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, f_n est la fonction définie sur $[0; 1]$ par :

$$f_n(x) = x^n e^x$$

On note C_n la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère $(0; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. On désigne par (I_n) la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

- On désigne par F_1 la fonction définie sur $[0; 1]$ par : $F_1(x) = (x - 1)e^x$. Vérifier que F_1 est une primitive de f_1 .
 - calculer I_1 .
- À l'aide d'une intégration par parties, établir la relation pour tout n supérieur ou égal à 1 :

$$I_{n+1} = e - (n + 1)I_n$$

- Calculer I_2 .
- On considère la fonction mystere écrite dans le langage Python :

```
from math import e # la constante d'Euler e
def mystere(n):
    a = 1
    L = [a]
    for i in range(1,n):
        a = e - (i + 1)*a
        L.append(a)
    return L
```

À l'aide des questions précédentes, expliquer ce que renvoie l'appel `mystere(5)`.

Partie II

- Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes $C_1, C_2, C_3, C_{10}, C_{20}$ et C_{30} :

- Donner une interprétation graphique de I_n .
 - Quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite (I_n) ?
- Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a :
$$0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx$$
 - En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Corrigé

Partie I

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0; 1], f_n(x) = x^n e^x, C_n$ courbe représentative de la fonction f_n dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan et :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

1. a. $\forall x \in [0; 1], F_1(x) = (x - 1)e^x$

Vérifier que F_1 est une primitive de f_1 .

$$F_1(x) = (x - 1)e^x$$

rappel : $(uv)' = u'v + uv'$

$$F_1'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

$$F_1'(x) = (1 + x - 1)e^x$$

$$F_1'(x) = xe^x$$

$$\text{Or, } f_1(x) = x^1 e^x = e^x$$

On a donc : $\forall x \in [0; 1], F_1'(x) = f_1(x)$.

On a $F_1 = f_1$ sur $[0; 1]$ autrement dit F_1 est une primitive de f sur $[0; 1]$.

b. Calcul de I_1

$$I_1 = \int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 f_1(x) dx$$

La fonction f_1 est continue sur $[0; 1]$ et F_1 est une primitive de f_1 sur cet intervalle donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_1(x) dx &= [F_1(x)]_0^1 = [(x - 1)e^x]_0^1 = (1 - 1)e^1 - (0 - 1)e^0 \\ &= 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

Conclusion : $I_1 = 1$.

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

$$\int_0^1 (x e^x) dx = 1$$

2. À l'aide d'une intégration par parties, établir la relation pour tout n supérieur ou égal à 1 : $I_{n+1} = e - (n + 1)I_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$$

$$\text{On pose : } \begin{array}{ll} u(x) = x^{n+1} & v'(x) = e^x \\ u'(x) = (n + 1)x^n & v(x) = e^x \text{ (convient)} \end{array}$$

Les fonctions u' et v' sont continues sur $[0; 1]$ donc on peut utiliser la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^1 u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x) dx$$

$$\int_0^1 x^{n+1} e^x dx = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n + 1)x^n e^x dx$$

$$\int_0^1 x^{n+1} e^x dx = [x^{n+1} e^x]_0^1 - (n + 1) \int_0^1 x^n e^x dx$$

Autrement dit :

$$I_{n+1} = 1^{n+1} e^1 - 0^{n+1} e^0 - (n + 1)I_n = e - 0 - (n + 1)I_n = e - (n + 1)I_n$$

On a donc bien : $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} = e - (n + 1)I_n$.

3. Calcul de I_2

Pour $n = 1$, la relation de récurrence précédente donne :

$$I_2 = e - (1 + 1)I_1 = e - 2I_1 = e - 2(1) = e - 2$$

$$I_2 = e - 2$$

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

$$\int_0^1 (x^2 e^x) dx = e - 2$$

4.

```
from math import e # la constante d'Euler e
def mystere(n):
    a = 1
    L = [a]
    for i in range(1,n):
        a = e - (i + 1)*a
        L.append(a)
    return L
```

Expliquer ce que renvoie l'appel `mystere(5)`.

`mystere(5)` renvoie la liste des nombres I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

Partie II

1. a. Donner une interprétation graphique de I_n .

f_n étant continue et positive sur $[0; 1]$, I_n représente l'aire du domaine située entre C_n , l'axe des abscisse et les droites verticales d'équations respectives $x = 0$ (c'est l'axe des ordonnées) et $x = 1$ exprimée en $u. a$.

b. Quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite (I_n) ?

On peut raisonnablement penser que l'aire du domaine décrit en a. tend vers zéro, autrement dit on peut conjecturer que : « $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ ».

2. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 : $0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx$

Pour tout $x \in [0; 1]$, on a : $x \leq 1$, or la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est croissante sur $[0; 1]$ donc : $e^x \leq e^1$, et comme $e^x > 0$ on en déduit : $0 \leq e^x \leq e$, en multipliant chaque membre par $x^n \geq 0$ on obtient :

$$x^n \times 0 \leq x^n \times e^x \leq x^n \times e \Leftrightarrow 0 \leq f_n(x) \leq e \times x^n$$

puis en intégrant dans l'ordre croissant des bornes :

$$\int_0^1 0 dx \leq \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 e \times x^n dx \Leftrightarrow [k]_0^1 \leq I_n \leq e \times \int_0^1 x^n dx$$

$$\Leftrightarrow k - k \leq I_n \leq e \times \int_0^1 x^n dx \Leftrightarrow 0 \leq I_n \leq e \times \int_0^1 x^n dx$$

On a donc bien, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx$.

3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} 1^{n+1} - \frac{1}{n+1} 0^{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

donc l'inégalité obtenue à la question 2. s'écrit : $0 \leq I_n \leq e \times \frac{1}{n+1}$

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$, donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} = 0$

puis par limite d'un produit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e \times \frac{1}{n+1}) = 0$

Résumons :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq e \times \frac{1}{n+1} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (e \times \frac{1}{n+1}) = 0 \end{cases}$$

donc par application du théorème des gendarmes on en déduit que (I_n) est convergente et que sa limite est 0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Ex 09 [d'après Bac, extrait, suite et intégrale]

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$$

1. Calculer $I_0 = \int_1^e x dx$.

2. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$$

3. En déduire I_1 et I_2 .

Corrigé

1. Calculer $I_0 = \int_1^e x dx$.

$x \mapsto x$ est continue sur $[1; e]$ et l'une de ses primitives est $x \mapsto \frac{1}{2} x^2$ donc :

$$\int_1^e x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^e = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} (1)^2 = \frac{e^2 - 1}{2}$$

Conclusion :

$$I_0 = \frac{e^2 - 1}{2}$$

2. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$.

Effectuons une intégration par parties de $I_{n+1} = \int_1^e x (\ln x)^{n+1} dx$

Pour tout $x \in [1; e]$, on pose :

$$u(x) = (\ln x)^{n+1} \quad v'(x) = x$$

$$u'(x) = (n+1)(\ln x)^n \times \frac{1}{x} \quad v(x) = \frac{x^2}{2} \text{ (convient)}$$

u' et v' sont continues sur $[1; e]$ donc on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\int_1^e u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_1^e - \int_1^e u'(x)v(x) dx$$

On obtient

$$\int_1^e x (\ln x)^{n+1} dx = \left[\frac{1}{2} x^2 (\ln x)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e (n+1) (\ln x)^n \times \frac{1}{x} \times \frac{1}{2} \times x^2 dx$$

$$\int_1^e x (\ln x)^{n+1} dx = \left[\frac{1}{2} x^2 (\ln x)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e (n+1) (\ln x)^n \times x \times \frac{1}{2} dx$$

$$I_{n+1} = \frac{e^2}{2} (\ln e)^{n+1} - \frac{1}{2} 1^2 (\ln 1)^{n+1} - \frac{n+1}{2} \int_1^e x (\ln x)^n dx$$

$$I_{n+1} = \frac{e^2}{2} \times 1^{n+1} - \frac{1}{2} \times 0^{n+1} - \frac{n+1}{2} I_n$$

$$I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$$

On a donc bien :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$$

3. En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 0$ on obtient :

$$I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{0+1}{2} I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - (e^2 - 1)}{4}$$

$$I_1 = \frac{e^2 + 1}{4}$$

Pour $n = 1$ on obtient :

$$I_2 = \frac{e^2}{2} - \frac{1+1}{2} I_1 = \frac{e^2}{2} - I_1 = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - (e^2 + 1)}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$$

$$I_2 = \frac{e^2 - 1}{4}$$

Ex 10* [suite et intégrale, d'après bac ASIE Juin 2014, extrait]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie sur $[0; 1]$ par : $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$

On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$.

- Les représentations graphiques de certaines fonctions f_n sont tracées : conjecturer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

- Calculer la valeur exacte de I_1 .
- a. Démontrer que, $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$
b. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a : $I_n \leq 1$.
- Démontrer que $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a : $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$
- Calculer l'intégrale :

$$\int_0^1 (1 - x^n) dx$$

- À l'aide des questions précédentes, démontrer que la suite (I_n) est convergente et déterminer sa limite.

Corrigé

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0; 1], f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$$
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$$

1. Conjecturer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

La fonction f_n est continue et positives sur $[0; 1]$ donc $\int_0^1 f_n(x) dx$ représente l'aire en u. a. du domaine plan délimité par la courbe représentative de f_n , l'axe des abscisses, et les droites verticales d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$, or il semble que, lorsque $n \rightarrow +\infty$, ce domaine se « rapproche de plus en plus » d'un carré de côté 1 donc on peut conjecturer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1$.

2. Calculer la valeur exacte de I_1 .

Pour $n = 1$ on obtient :

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^1} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0; 1]$ et l'une de ses primitives sur cet intervalle est $x \mapsto \ln(1+x)$ donc :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(1+1) - \ln(1+0) = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

Finalement : $I_1 = \ln(2)$.

3. a. Démontrer que, $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$.

Soit $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$1 - \frac{1}{1+x^n} = \frac{1+x^n}{1+x^n} - \frac{1}{1+x^n} = \frac{1+x^n - 1}{1+x^n} = \frac{x^n}{1+x^n}$$

$x^n \geq 0$, $1+x^n > 0$ donc $\frac{x^n}{1+x^n} \geq 0$, par conséquent : $1 - \frac{1}{1+x^n} \geq 0$,

autrement dit : $\frac{1}{1+x^n} \geq 1$.

On a donc bien : $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$.

b. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a : $I_n \leq 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in [0; 1]$ on :

$$\frac{1}{1+x^n} \leq 1$$

En intégrant dans l'ordre croissant des bornes, on en déduit :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx \leq \int_0^1 1 dx$$

$I_n \leq [x]_0^1$, or : $[x]_0^1 = 1 - 0 = 1$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n \leq 1$.

4. Démontrer que $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a : $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$.

Soit $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^n} - (1-x^n) &= \frac{1}{1+x^n} - \frac{(1-x^n)(1+x^n)}{1+x^n} \\ &= \frac{1 - (1+x^n - x^n - x^{2n})}{1+x^n} = \frac{x^{2n}}{1+x^n} \end{aligned}$$

Or, $x^{2n} \geq 0$, $1+x^n > 0$ donc $\frac{x^{2n}}{1+x^n} \geq 0$, par conséquent :

$$\frac{1}{1+x^n} - (1-x^n) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{1+x^n} \geq 1-x^n \Leftrightarrow 1-x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$$

On a donc bien, $\forall x \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$.

5. Calculer l'intégrale : $\int_0^1 (1-x^n) dx$.

La fonction $x \mapsto 1-x^n$ est continue sur $[0; 1]$ et l'une de ses primitives sur cet intervalle est $x \mapsto x - \frac{x^{n+1}}{n+1}$ donc :

$$\int_0^1 (1-x^n) dx = \left[x - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = 1 - \frac{1^{n+1}}{n+1} - \left(0 - \frac{0^{n+1}}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 (1-x^n) dx = 1 - \frac{1}{n+1}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a montré en 4. que $\forall x \in [0; 1]$, $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$

donc en intégrant dans l'ordre croissant des bornes :

$$\int_0^1 (1-x^n) dx \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$$

c'est-à-dire :

$$1 - \frac{1}{n+1} \leq I_n$$

Or, on a montré **3. b.** que : $I_n \leq 1$ donc :

$$1 - \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq 1$$

On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1 - \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq 1$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} = 0$ puis par limite d'une différence : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$.

On a donc :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, 1 - \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1 \end{cases}$$

donc d'après le théorème des gendarmes on en déduit que la suite (I_n) est convergente et que sa limite est 1 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1$.

Ex 11 [estimation d'une aire, Python]

$$\forall x \in x \in [0; 1], f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan et on se propose d'estimer l'intégrale : $I = \int_0^1 f(x) dx$, c'est-à-dire d'estimer l'aire du domaine du plan délimité $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$:

On ne cherchera pas à obtenir une primitive de f sur $[0; 1]$.

1. Vérifier que $B_0(0; 1)$ et $B_4\left(1; \frac{1}{2}\right)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$ puis démontrer que sur l'intervalle $[0; 1]$ la droite (B_0B_4) est située sous $\mathcal{C}_f$ (au sens large), en déduire que $0,75 \leq I$.
2. On s'intéresse à la somme $S(4)$ des aires des rectangles représentés ci-après avec : $\forall n \in \{0; 1; 2; 3; 4\}, A_n\left(\frac{n}{4}; 0\right)$ et $B_n\left(\frac{n}{4}; f\left(\frac{n}{4}\right)\right)$

Compléter sans justification le programme Python sachant qu'il calcule $S(4)$:

```
01 def f(x:float):
02     return 1/(x**2+1)
03 S=0
04 for n in range(4):
05     S=S+
06     print("S(4)=",S)
```

3. Adapter ce programme pour obtenir une valeur approchée de I en utilisant 1 000 rectangles et non plus 4 comme dans la question précédente, et en notant $S(1000)$ la somme alors obtenue.

Corrigé

$$\forall x \in x \in [0; 1], f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$I = \int_0^1 f(x) dx$$

1. • Vérifions que $B_0(0; 1)$ et $B_4\left(1; \frac{1}{2}\right)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$

$$f(x_{B_0}) = f(0) = \frac{1}{0^2+1} = \frac{1}{1} = y_{B_0} \text{ donc } B_0 \in \mathcal{C}_f$$

$$f(x_{B_4}) = f(1) = \frac{1}{1^2+1} = \frac{1}{2} = y_{B_4} \text{ donc } B_4 \in \mathcal{C}_f$$

• Équation réduite de (B_0B_4)

L'équation réduite de (B_0B_4) s'écrit $y = ax + b$ avec :

$$a = \frac{y_{B_4} - y_{B_0}}{x_{B_4} - x_{B_0}} = \frac{\frac{1}{2} - 1}{1 - 0} = -\frac{1}{2}$$

$$b = y_{B_0} = 1$$

(B_0B_4) admet pour équation réduite : $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

• Démontrons que sur l'intervalle $[0; 1]$ la droite (B_0B_1) est située sous $\mathcal{C}_f$ (au sens large)

Pour tout $x \in [0; 1]$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) &= \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{x}{2} - \frac{2}{2} = \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{x - 2}{2} \\ &= \frac{1 \times 2}{2(x^2 + 1)} + \frac{(x - 2)(x^2 + 1)}{2(x^2 + 1)} = \frac{2 + (x - 2)(x^2 + 1)}{2(x^2 + 1)} \\ &= \frac{2 + x^3 + x - 2x^2 - 2}{2(x^2 + 1)} = \frac{x^3 - 2x^2 + x}{2(x^2 + 1)} = \frac{x(x^2 - 2x + 1)}{2(x^2 + 1)} \\ &= \frac{x(x - 1)^2}{2(x^2 + 1)} \end{aligned}$$

Pour tout $x \in [0; 1]$, on a :

$$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) = \frac{x(x - 1)^2}{2(x^2 + 1)}$$

Or, pour tout $x \in [0; 1]$, on a :

$$x \geq 0, (x - 1)^2, 2 > 0 \text{ et } x^2 + 1 > 0 \text{ donc } \frac{x(x - 1)^2}{2(x^2 + 1)} \geq 0$$

donc : $-\frac{1}{2}x + 1 \leq f(x)$. Par conséquent sur $[0; 1]$, (B_0B_4) est située en

dessous (au sens large) de $\mathcal{C}_f$.

En déduire que $0,75 \leq I$

Pour tout $x \in [0; 1]$, on a :

$$-\frac{1}{2}x + 1 \leq f(x)$$

donc en intégrant dans l'ordre croissant des bornes :

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$$

Or :

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) dx = \left[-\frac{1}{2} \frac{x^2}{2} + x\right]_0^1 = -\frac{1^2}{4} + 1 - \left(-\frac{0^2}{4} + 0\right) = \frac{3}{4} = 0,75$$

On a donc bien : $0,75 \leq I$.

2. $\forall n \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$:

Compléter le programme Python sachant qu'il calcule $S(4)$:

```
01 def f(x:float):
02     return 1/(x**2+1)
03 S=0
04 for n in range(4):
05     S=S+1/4*f((n+1)/4)
06 print("S(4)=",S)
```

Adapter ce programme pour obtenir une valeur approchée de I en utilisant 1 000 rectangles et non plus 4 comme dans la question précédente, et en

notant $S(1\ 000)$ la somme alors obtenue.

```
01 def f(x:float):
02   return 1/(x**2+1)
03 S=0
04 for n in range(1000):
05   S=S+1/1000*f((n+1)/1000)
06 print("S(1000)=",S)
```

On obtient, en faisant tourner le programme :

$S(1000) = 0.7851481217307804$

C'est une bonne valeur approchée de I . En adaptant ce programme à

1 000 000 de rectangles on obtient : $S(1\ 000\ 000) = 0.7853979133973917$

C'est une très bonne approximation de I .

On pourra démontrer après le bac que :

$$\int_0^1 f(x) dx = [\arctan(x)]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$